

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Kalibrace uretry či dilatace močové trubice

Kalibrace močové trubice se provádí k diagnostice zúžení močové trubice, a to kalibrační sondou s několika olivkami ke stanovení stupně zúžení. Dilatace uretry znamená rozšíření močové trubice, užívá se k léčbě zúžení močové trubice, k tomu se používají katétry, sondy či bužie.

#### Popis zdravotního výkonu

Zárok nevyžaduje žádnou přípravu. Provádí se v poloze na zádech, po dezinfekci zevního ústí močové trubice a následné aplikaci znečítlivujícího gelu se do močové trubice zavádí cévka, sonda či bužie. Na přání pacienta však lze tento zákrok provést i v celkové či svodné anestezii, avšak již za krátkodobé hospitalizace s nutností interního předoperačního vyšetření. Délka samotného zákroku je několik vteřin až minut v případě dilatace, zavedení sondy je nepříjemné až mírně bolestivé. Po výkonu je třeba dodržovat pitný režim a klidový režim minim. 24 hodin. Pokud by 24hodin po výkonu přetrvávaly potíže jako pálení a řezání při močení, bolesti, krvácení a zvýšené teploty, dostavte se k akutnímu ošetření či kontrole na urologii.

#### Komplikace zdravotního výkonu

Komplikace jsou spojené spíše s dilatací močové trubice, nejsou příliš časté ani závažné. Jde většinou o pocity řezání a pálení v močové trubici, ojediněle může nastat krvácení z močové trubice či prostaty. Obtíže většinou během několika hodin odezní. Jiné komplikace, jako například zvýšená teplota či zástava močení jsou vzácné, ojediněle může po výkonu nastat zánět dolních močových cest / zánět močové trubice s následným vznikem zúžení, zánět močového měchýře, i mužů pak i zánět prostaty, varlat a nadvarlat /. Pokud není zánět dolních cest močových včas léčen, může dojít k rozvoji zánětu i na horní cesty močové /ledviny/ s následným rozvojem systémové celkové infekce organismu, sepse (otravy krve). K těmto komplikacím přistupujeme s preventivním opatřením u rizikových pacientů. Komplikace se při výskytu dají vždy řešit.

**Prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl(a) jsem poučen(a) i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl(a) možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom(a) všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Byl(a) jsem informován(a) a vzal(a) jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.**

Jméno a příjmení pacienta .....

Rodné číslo pacienta .....

V Jihlavě dne: .....

Podpis pacienta.....

Podpis lékaře.....